

Campanha Multivacinação 2017



Campanha Multivacinação 2017

Data: 11 a 22 de setembro

Dia “D”: 16 de setembro

Horário: 8 a 17 horas

Campanha Multivacinação 2017

Objetivo: Resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação, visando atualizar a caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Campanha Multivacinação 2017

Meta

A vacinação será seletiva para a população-alvo, desta forma não há meta a ser alcançada, no entanto, na ocasião da Campanha será avaliado o número de doses aplicadas no período.

Informações Técnicas Sobre Vacinas



BCG

- Dose única ao nascer.
- A comprovação da vacinação com BCG se dá por meio do registro da vacinação no cartão ou caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de nódulo, no deltoide direito, na ausência de cicatriz.
- Crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a vacinação até que atinjam este peso.
- Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas.



VACINA HEPATITE B



Vacina Hepatite B (recombinante)

Esquemas de vacinação

- **Para recém-nascidos:** administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento.
- Para crianças maiores de 1 mês de idade não vacinadas, agendar a vacina penta para os dois meses de idade.
- Completar o esquema de vacinação contra hepatite B com a combinada vacina pentavalente, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade.

Intervalo entre as doses da Vacina Hepatite B (recombinante)

ROTINA - ACIMA de 7 anos

1ª dose: Dia zero

2ª dose: 30 dias (1 mês) após a 1ª dose;

3ª dose: 180 dias (6 meses) após a 1ª dose;

1) Em caso de atraso da 2ª dose, até o 4º mês após aplicação da 1ª dose (dia zero):

Conduta: Fazer a 2ª dose e manter a 3ª dose agendada para o 6º mês (180 dias).

2) Em caso de atraso da 2ª dose, após o 5º mês da aplicação da 1ª dose:

Conduta: Fazer a 2ª dose e agendar a 3ª dose para 60 dias após

Vacina Hepatite B (recombinante)

Esquemas de vacinação crianças maiores de 7 anos e adolescentes

- **Não vacinadas ou sem comprovação vacinal:** Administrar 3 (três) doses com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 (seis) meses entre a primeira e a terceira dose.
- **Com esquema incompleto:** não reiniciar, completar conforme a situação encontrada.
- **Adolescentes gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional:** Iniciar ou completar o esquema, conforme situação encontrada. Caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir após o parto.

Vacina Hepatite B (recombinante)

Laboratório	Faixa etária e volume da dose	Validade após abertura do frasco
Instituto Butantan	até 19 anos - 0,5 ml	15 dias, se mantida em condições assépticas e armazenado em temperatura entre +2°C a +8°C
	acima de 20 anos - 1 ml	
Serum Institute of India	até 19 anos - 0,5 ml	28 dias, se mantida em condições assépticas e armazenado em temperatura entre +2°C a +8°C
	acima de 20 anos - 1 ml	
Sanofi Pasteur	até 15 anos – 0,5 ml	10 dias, se mantida em condições assépticas e armazenado em temperatura entre +2°C a +8°C
	acima de 16 anos – 1 ml	
LG Life Sciences	até 15 anos – 0,5 ml	28 dias, se mantida em condições assépticas e armazenado em temperatura entre +2°C a +8°C
	acima de 16 anos – 1 ml	

**VACINA ADSORVIDA
DIFTERIA, TÉTANO,
Pertussis, HEPATITE B e
Haemophilus influenzae b
(CONJUGADA)(Pentavalent)**



Vacina Pentavalente

Esquema

Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. A terceira dose **não** deverá ser dada antes dos 6 (seis) meses de idade.

Particularidades:

Na rotina dos serviços, a vacina Penta está disponível para crianças até 6 (seis) anos, 11 meses e 29 dias, sendo contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.

Iniciar ou complementar esquema com Penta, de acordo com a situação encontrada, nas crianças com até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias.

VACINA ORAL ROTAVÍRUS HUMANO



Vacina Rotavírus

✓ Idade e esquema:

1ª dose: 2 meses (1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias)

2ª dose : 4 meses (3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias)

Atenção!

- **NÃO INICIAR** esquema de vacinação após a data limite de 3 meses e 15 dias, ou seja, a criança que perdeu o prazo (idade) para fazer a 1ª dose, não tomará nenhuma dose;

- Criança que perdeu prazo (idade) para fazer a 2ª dose (7 meses e 29 dias), ficará apenas com a 1ª dose.

VACINA
POLIOMIELITE 1,2,3
(INATIVADA) (VIP)



VIP

- ✓ Crianças a partir de dois meses de idade a menor de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias):
 - Primeira dose: 2 meses,
 - Segunda dose: 4 meses
 - Terceira dose: 6 meses.

VIP

Nota

- ✓ Em usuários menores de 5 anos de idade sem comprovação vacinal, administre esquema sequencial.
- ✓ Criança filha de mãe HIV positivo deve receber o **esquema básico e também os reforços com a vacina VIP**, mesmo antes da definição diagnóstica.

VACINA PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE



Vacina Pneumo-10 valente

Esquema

- 2 (duas) doses: aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.

Reforço:

- Administrar 1 (um) reforço preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrado até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Vacina Pneumo-10 valente

Particularidades:

- Crianças que iniciaram o esquema primário após 4 (quatro) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses;
- Administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose.
- O reforço deve ser administrado entre 12 meses a 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias.
- Crianças sem comprovação vacinal, entre 12 meses e 4 anos de idade, administrar dose única.

Vacina Adsorvida Meningocócica C (Conjugada CRM197)



Vacina Meningococica C

Esquema

- 2 (duas) doses: aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.

Reforço

- Administrar o reforço aos 12 meses de idade.

- Reforço ou dose única para adolescentes de 12 e 13 anos de idade.

Vacina Meningococica C

Particularidades

- Crianças que iniciaram o esquema primário após 5 (cinco) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose.
- O reforço deve ser administrado entre 12 meses a 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias.

Vacina Meningococica C

Notas

- Adolescente gestante, não administrar dose de Meningo C. (Conforme orientação da Bula)

VACINA FEBRE AMARELA



Vacina Febre amarela

Esquema

- ✓ Administrar 1 (uma) dose aos 9 (nove) meses de idade.
- ✓ A pessoa que já recebeu uma dose da vacina de febre amarela ao longo da vida será considerado vacinado.

Vacina Febre amarela

Em crianças menores de 2 anos de idade nunca vacinadas, não administre tal vacina simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e/ou varicela, estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado.

VACINA TRÍPLICE VIRAL



Vacina Tríplice Viral

Esquema

- ✓ Crianças de 12 meses a menores de 5 anos:
 - Primeira dose: 12 meses.
 - Reforço: 15 meses com a vacina tetra viral.

- ✓ **Crianças acima de 5 anos e adolescentes não vacinados ou com esquema incompleto:** administre 2 doses conforme situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

VACINA TETRA VIRAL



Vacina Tetra Viral

Esquema

- Um dose aos 15 meses de idade em crianças que tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.
- ✓ Pode ser administrada administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
- ✓ Na indisponibilidade da vacina tetra viral, administrar simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de varicela (atenuada).

VACINA POLIOMIELITE 1 e 3 (ATENUADA) VOPb



VOPb

Esquema

Crianças a partir dos 15 meses a menor de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem receber:

- ✓ 1º reforço: 15 meses
- ✓ 2º reforço: 4 anos

VACINA DTP - Difteria, Tétano e Pertussis (Coqueluche)



Vacina DTP

ESQUEMA

- ✓ Crianças de 15 meses a menores de 7 anos (6 anos, 11 meses e 29 dias):
 - ✓ Primeiro reforço: 15 meses
 - ✓ Segundo reforço: 4 anos.

- ✓ Administrar o 1º reforço com intervalo mínimo de 6 meses após a última dose do esquema primário.

Vacina DTP

ESQUEMA

- ✓ Crianças com 4 anos de idade, sem nenhum reforço, administrar 2 reforços, considerando o intervalo de 6 meses entre eles.
- ✓ Crianças entre 5 e 6 anos de idade que apresente um reforço, administrar um segundo reforço. Crianças sem nenhum reforço administrar apenas um reforço.

VACINA HEPATITE A



Vacina Hepatite A

Esquema

- ✓ Crianças de 15 meses a 23 meses de idade devem receber uma dose dessa vacina.
- ✓ Crianças de 2 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias devem receber uma dose dessa vacina caso tenham perdido a oportunidade de serem vacinadas anteriormente.

VACINA DUPLA ADULTO dT



Vacina Dupla adulto

Esquema

Indicada para crianças e adolescentes a partir dos 7 anos de idade para os reforços, esquema incompleto ou não vacinados:

- ✓ **Com esquema vacinal completo:** administre uma dose a cada 10 anos.
 - ✓ **Com esquema incompleto:** complete o esquema.
 - ✓ **Sem comprovação vacinal:** administre três doses.
-
- O intervalo entre as doses é de 60 dias, mínimo de 30.
 - Após completar o esquema administrar uma dose a cada 10 anos.
 - Nunca reinicie o esquema.

Vacina Dupla adulto

Esquema

- ✓ Na adolescente gestante a vacina dupla adulto pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em qualquer período gestacional.
- ✓ Completar o esquema vacinal, preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto.

Vacina dTpa Difteria, Tétano e Pertussis (Coqueluche) acelular



Vacina dTpa

Esquema para Adolescentes gestantes

- ✓ Indicada a partir da 20^a semana (ideal) a 36^a semana de gestação, preferencialmente, administrar a vacina dTpa até 20 dias antes da data provável do parto, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano (dT).
- ✓ Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose no puerpério o mais precocemente possível (até 45 dias).

VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6, 11, 16 e 18 (recombinante) - HPV



Vacina HPV

Esquema

- Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos: 0 e 6 meses
- Crianças e adolescentes de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV/AIDS e CRIE: 0, 2 e 6 meses.
- ✓ Meninas e meninos que receberam D1 e não completaram o esquema vacinal mesmo após o período de 6 meses devem receber a D2.

Vacina HPV

Esquema

- Para os adolescentes que:
 - ✓ Iniciaram a 1ª dose da vacina aos 14 anos de idade, a 2ª dose deverá ser administrada com um intervalo mínimo de seis meses e máximo de 12 meses.
 - ✓ Receberam D2 com menos de 6 meses após terem recebido a D1, devem receber uma terceira dose para completar o esquema.

Vacina HPV

Esquema

- ✓ Não iniciar esquema para adolescentes maiores de 14 anos, 11 meses e 29 dias.
- ✓ Crianças e adolescentes que completaram o esquema vacinal com a vacina bivalente não devem ser revacinadas.

Vacina HPV

Notas

→ Deve-se evitar a gravidez durante o esquema de vacinação com a vacina HPV. No entanto em situação de vacinação inadvertida, não se recomenda a interrupção da gestação. A gestante deve ser acompanhada durante o pré-natal. O esquema deve ser completado após o parto.

Intervalo entre vacinas

Não vivo/Não vivo (inativada/inativada)	Nenhum intervalo
Vírus vivo atenuado/ Não vivo (atenuada/inativada)	Nenhum intervalo
Vírus vivo atenuado/Vírus vivo atenuado (atenuado/atenuado)	Intervalo de 30 dias: Menores de 2 anos - Febre Amarela com Tríplice Viral e/ou Tetra Viral para primovacinados. (para ambas as vacinas). (NT nº 20/2014 PNI/MS)

Recomendações Gerais

- Conservação: as vacinas devem ser conservadas a temperatura de +2°C a +8°C.
- A utilização das vacinas, após abertura do frasco, deve ser dentro do prazo e temperatura estabelecidos pelo laboratório produtor, em condições assépticas.
- As sobras das vacinas utilizadas nos postos volantes devem ser desprezadas após uma jornada de trabalho.

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina	Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.
Dupla adulto dT	Biological - 4 semanas Butantan – 15 dias Intervax – 4 semanas Serum Institute of India – 4 semanas
DTP	Butantan – 15 dias Serum Institute of India – 4 semanas
dTpa	Butantan – uso imediato GlaxoSmithKline – uso imediato
Penta	Biological - unidose - uso imediato Serum Institute of India – unidose – uso imediato
Hepatite A	Butantan/ Merk Sharp Dome – unidose – uso imediato
BCG	Serum Institute of India – 6 horas Fundação Atauilpho de Paiva – 6 horas

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina	Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.
Febre amarela	Fundação Oswaldo Cruz – 6 horas Sanofi Pasteur – 6 horas
Hepatite B	Butantan – 15 dias Serum Institute of India – 28 dias LG – 28 dias
HPV	Butantan – uso imediato
Meningite C	Fundação Ezequiel Dias – unidose – uso imediato
Pneumo 10	Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato
VOPb	Fundação Oswaldo Cruz – 5 dias

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina	Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.
VIP	Sanofi Pasteur – 28 dias
Rotavírus	Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato
Tríplice Viral	Fundação Oswaldo Cruz – 8 horas Serum Institute of India – 6 horas
Tetraviral	Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato
Varicela	Fundação Oswaldo Cruz / GlaxoSmithKline – unidose – uso imediato Green Cross – unidose – uso imediato Merck Sharp Dome – unidose – uso imediato

Precauções Gerais

1. Doenças febris graves
2. Imunodeprimidos ou em uso de drogas imunossupressoras
3. Pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue e derivados
4. Alergias (urticárias, pruridos) a medicamentos e alimentos.

Contraindicações gerais

1. Para qualquer vacina: anafilaxia a qualquer um dos componentes de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma
2. Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados: imunodepressão e gravidez
3. Encefalopatia nos primeiros 7 dias após a aplicação de uma dose de vacina, contendo o componente *pertussis*: é contraindicada a utilização posterior de qualquer tipo de vacina que contenha este componente

Eventos adversos pós vacinação

Notificar e investigar:

- Todos os eventos adversos;
- Eventos graves e inusitados notificação imediata a instância superior;
- Erros programáticos;
- Eventos em grupos de pessoas;
- Rumores e sinais sobre possível causalidade entre um evento adverso e uma vacina.

OBRIGADA!!

pnigoias@gmail.com

62.3201.7888/7882