

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2019.



Secretaria de Estado da Saúde
Governo de Goiás

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Esta campanha é uma estratégia diferenciada para interromper a circulação do vírus do sarampo no Brasil e será realizada em duas etapas.




CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Objetivo: Resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação para a vacina tríplice viral das crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) e pessoas de 20 a 29 anos de forma seletiva.



Distribuição dos casos confirmados de sarampo hospitalizados, por faixa etária, 2014, 2015, 2018 e 2019, Brasil.



Fonte: SINAN.

^aDados atualizados em 12/09/2019 e sujeitos a alterações.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

1ª Fase

Data: 07 a 25 de outubro

Dia “D”: 19 de outubro

Público alvo:

Intensificação: Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias

Rotina: 12 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias



CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

2ª Fase

Data: 18 a 30 de novembro

Dia “D”: 30 de novembro

Público alvo:

Rotina: Adultos de 20 a 29 anos



CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Meta 1ª fase

Vacinar com tríplice viral na estratégia **intensificação** as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias e **rotina** de forma seletiva (tríplice viral/tetra viral) crianças de 12 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.



CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Meta 2ª fase

Vacinar com a vacina tríplice viral e/ou dupla viral, de forma seletiva na rotina adultos de 20 a 29 anos.



VACINA TRÍPLICE VIRAL



Vacina Tríplice Viral

Esquema vacinal para as crianças

- **Dose zero:** crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias.

Rotina

- **Primeira dose:** 12 meses
- **Reforço:** 15 meses com a vacina tetra viral



Vacina Tríplice Viral

Atenção

Para crianças que receberam a dose zero da vacina entre 6 meses a 11 meses e 29 dias, esta **não será considerada válida para fins de Calendário Nacional de Vacinação**, devendo ser agendada a partir dos 12 meses com a vacina tríplice viral respeitando o intervalo de 30 dias entre as doses.



Vacina Tríplice Viral

Esquema vacinal para adultos

- ✓ Rotina de forma seletiva
- ✓ **Vacinar indivíduos de 20 a 29 anos:**
- ✓ **Não vacinados:** duas doses com intervalo de 30 dias
- ✓ **Esquema incompleto:** completar esquema respeitando intervalo de 30 dias da primeira dose.
- Considerar vacinado quem comprovar em cartão duas doses de vacina contendo o componente sarampo (dupla viral, tríplice viral ou sarampo monovalente administrada após os 12 meses de idade)

Orientações para as ações de vacinação na administração da vacina tríplice viral, segundo laboratório produtor.

Laboratório produtor	Indicação	Apresentação	Conservação e utilização após a reconstituição	Cuidados específicos para a administração da vacina
Fiocruz/Bio-Manguinhos	A partir dos 6 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola multidose + diluente	Pode ser utilizada no máximo até 8 (oito) horas desde que mantidas as condições assépticas, em temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz	Nenhum
MerckSharpDone (MSD)	A partir dos 6 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola unidose + diluente	Acondicionada temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz. Deve ser utilizada imediatamente após a reconstituição.	Pessoas portadoras de trombocitopenia somente devem receber essa vacina após avaliação clínica e autorização/ prescrição médica.
<i>Serum Institute of India Ltda.</i>	A partir dos 9 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola unidose + diluente	Acondicionada temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz. Deve ser utilizada imediatamente após a reconstituição.	Não administrar em pessoas portadoras de alergia à proteína do leite de vaca.

Orientações para as ações de vacinação na administração da vacina dupla viral, segundo laboratório produtor.

Denominação Comum Brasileira (DCB)	VACINA SARAMPO E RUBEOLA (atenuada)
Laboratório produtor	Serum Institute of India Ltd.
Indicação	Indicação de uso: Uso adulto e pediátrico Contra indicada para mulheres grávidas
Apresentação	Frasco monodose: 1 doses + diluente Frasco multidose: 2 doses + diluente 5 doses + diluente 10 doses + diluente
Forma Farmacêutica	Pó liofilizado + diluente
Via de administração	Subcutânea
Composição por dose de 0,5 mL	No mínimo 1.000 CCID ₅₀ do vírus de sarampo, cepa <u>Edmonston-Zagreb</u> ; No mínimo 1.000 CCID ₅₀ do vírus de rubéola, cepa <u>Wistar RA 27/3</u> . Pode conter traços de neomicina. Diluente: Água para injeção.
Conservação	Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz.
Cuidados de conservação após a reconstituição	Pode ser utilizada <u>no máximo até 6 (seis) horas</u> desde que mantidas as condições assépticas e a temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS

VACINA TETRA VIRAL



Vacina Tetra Viral

Esquema

- Um dose aos 15 meses de idade em crianças que tenham recebido a **primeira dose da vacina tríplice viral após os 12 meses de idade.**

- ✓ Pode ser administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
- ✓ Na indisponibilidade da vacina tetra viral, administrar simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de varicela (atenuada).



Particularidades

- ✓ Crianças a partir de 9 meses com agendamento de vacina febre amarela, priorizar neste momento a vacina tríplice viral e agendar a febre amarela com intervalo de 30 dias após.
- ✓ Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos 1(um) mês após a vacinação.
- ✓ Puérperas podem tomar a vacina tríplice viral a qualquer momento.

Precauções Gerais

1. Doenças febris
2. Imunodeprimidos ou em uso de drogas imunossupressoras, deverão ser avaliadas e vacinadas segundo as recomendações do manual do CRIE.
3. Pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue e derivados
4. Alergias (urticárias, pruridos) a medicamentos e alimentos.
5. **Não vacinar** crianças menores de 9 meses e com alergia a proteína do leite de vaca com a vacina tríplice viral do Laboratório Serum Institute of India Ltd.

Contraindicações gerais

1. Para qualquer vacina: anafilaxia a qualquer um dos componentes de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma
2. Gravidez e crianças menores de 6 meses (mesmo em situação de surto)
3. Pessoas com suspeita de doença de sarampo, caxumba ou rubéola

Eventos adversos pós vacinação

Notificar e investigar

- Todos os eventos adversos;
- Eventos graves e inusitados notificação imediata a instância superior;
- Erros em Imunização;
- Eventos em grupos de pessoas;
- Rumores e sinais sobre possível causalidade entre um evento adverso e uma vacina.




Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral 1ª fase da campanha: 07 a 25/10/2019

Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias.

-Estratégia: **INTENSIFICAÇÃO.**

-Dose: **Dose**

OBS.: Dose não considerada válida.



The image shows a screenshot of a web-based registration form for the Tríplice Viral vaccine. The form has four main fields, each with a dropdown menu:

- Grupo de Atendimento: *** População geral
- Estratégia: *** Intensificação
- Imunobiológico: *** Tríplice viral - SCR
- Dose: *** Dose

The 'Dose' dropdown menu is open, showing a search bar and a list of options: 'Selecione', '1ª Dose', '2ª Dose', and 'Dose'. A blue arrow points to the 'Dose' option, which is highlighted with a yellow background. A magnifying glass icon is visible next to the search bar in the dropdown menu.

Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral

Crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias.

-Estratégia: **ROTINA.**

-Dose: **De acordo com a situação vacinal encontrada.**

Grupo de Atendimento: * População geral

Estratégia: * Rotina

Imunobiológico: * Tríplice viral - SCR

Dose: * Selecione

Data de Aprazamento:

Laboratório: *

Lote:

Selecione

1ª Dose

2ª Dose


Limpar Adicionar

Instruções para o registro da vacina Tetra Viral

Crianças a partir de 15 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.

-Estratégia: **ROTINA.**

-Dose: **Única**



Rotina

Tetra Viral - Tetra Viral

Selecione

|

Selecione

Única

Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral 2ª fase da campanha: 18 a 30/11/2019

População de 20 a 29 anos 11 meses e 29 dias.

-Estratégia: **ROTINA.**

-Dose: **De acordo com a situação vacinal encontrada.**

População geral

Rotina

Tríplice viral - SCR

Selecione

Selecione

1ª Dose

2ª Dose

OBRIGADA!

62.3201.7888/7882
pnigoias@gmail.com



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



GOVERNO DO ESTADO