

SARAMPO

Esquema básico

Pessoas na faixa etária entre 12 meses a 29 anos de idade

Crianças de 12 meses de idade – vacina **Tríplice Viral**.

Crianças de 15 meses – vacina **Tetra Viral**.

A partir de 5 anos de idade são duas doses da vacina **Tríplice Viral**. Complementar ou iniciar esquema conforme a situação vacinal encontrada.

Pessoas de 30 a 49 anos de idade

Comprovar uma dose da vacina com componente sarampo.

Profissionais de saúde independente da idade

Comprovar duas doses da vacina Tríplice Viral.

Atenção!

As vacinas são desenvolvidas para prevenir doenças e salvar vidas.

As vacinas tríplice viral e tetra viral proporcionam proteção contra Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela.



O sarampo pode matar



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Superintendência de Vigilância em Saúde
Gerência de Imunização

Avenida 136, Setor Sul
Edifício César Sebba, Qd. F-44 Lts. 22/24.
Goiânia-GO. CEP: 74093-250

Contatos:
telefone: (62)3201-7882/7888


E-mail: pnigoias@gmail.com

SARAMPO



“Prevenir é
sempre a melhor
opção”

INDICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO NA ROTINA



O sarampo é uma doença infecciosa viral muito contagiosa. Crianças pequenas e desnutridas quando infectadas podem evoluir para complicações e até mesmo óbitos.

Sintomas: Febre alta (acima de 38,5°C), exantema generalizado, sintomas respiratórios como tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik na mucosa oral (pequenos pontos branco-amarelados).

Contágio: Ocorre por contato direto, através de secreções nasofaríngeas ao tossir, espirrar, falar e respirar.

Período de transmissão: Inicia-se 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento.

Medidas de controle: Na suspeita ou confirmação da doença deve-se proceder a imediata notificação à autoridade sanitária, acompanhamento e tratamento de suporte adequado e o bloqueio vacinal seletivo.

Criança de 12 a 14 meses de idade não vacinada com a vacina tríplice viral.	Administrar D1 de tríplice viral e agendar dose única de tetra viral a partir dos 15 meses de idade, considerando o intervalo de 30 dias.
Criança entre 12 a 14 meses de idade vacinada com D1 de tríplice viral + uma dose de varicela monovalente.	Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela monovalente) a partir dos 15 meses de idade. Considerar intervalo de 30 dias da dose anterior.
Criança entre 12 a 14 meses de idade vacinada com a varicela monovalente e não vacinada com tríplice viral.	Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela) a partir dos 15 meses de idade. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança a partir de 1 ano de idade com registro de uma dose da vacina tríplice viral administrada antes de completar 12 meses de idade.	Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a tetra viral para 15 meses de idade. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos vacinada com D1 de vacina tríplice viral.	Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Agendar a D2 de varicela monovalente a partir dos 4 anos de idade. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos vacinada com D1 de tríplice viral + uma dose de varicela monovalente.	Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Considerando intervalo de 30 dias da dose anterior.
Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade sem nenhuma dose da vacina com os componentes sarampo, caxumba, rubéola e varicela.	Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Considerar intervalo mínimo de 30 dias. Atentar para a D2 da varicela monovalente para os 4 anos de idade.
Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos que recebeu uma dose da vacina varicela e não tem nenhuma de tríplice viral.	Administrar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Agendar a D2 de tríplice viral. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança a partir de 15 meses de idade que recebeu duas doses da vacina varicela e não tem nenhuma dose de tríplice viral.	Administrar D1 de tríplice viral. Agendar D2 de tríplice viral. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança entre 5 a 6 anos de idade com registro de uma dose da vacina tetra viral.	Administrar uma dose de tríplice viral + varicela monovalente. Considerando intervalo de 30 dias da dose anterior.
Criança entre 5 a menor de 7 anos de idade sem histórico vacinal para os componentes sarampo, caxumba, rubéola e varicela.	Administrar D1 de tríplice viral + D1 de varicela monovalente. Agendar D2 de tríplice viral + D2 de varicela. Com intervalo de 30 dias entre as doses.
Criança de 5 a 6 anos de idade com somente uma dose de tríplice viral.	Administrar D2 de tríplice viral + D1 de varicela monovalente. Agendar a D2 de varicela. Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.
Pessoas de 12 meses a 29 anos de idade.	Nesta faixa etária considerar vacinadas as pessoas que comprovarem o recebimento de duas doses de dupla viral, tríplice viral ou tetra viral.
Pessoas de 30 a 49 anos de idade.	Nesta faixa etária comprovar o recebimento de uma dose de vacina contendo o componente sarampo.
Trabalhador da saúde independente da idade.	O esquema vacinal consiste de duas doses de vacina contendo o componente sarampo.

A dose única da vacina tetra viral é indicada aos 15 meses de idade, podendo ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias
A vacina com o componente varicela na rotina é indicada para crianças até menor de 7 anos de idade.